

農林水産省登録
第23993号


殺菌剤

ゲンシヤ[®]

フロアブル

®は登録商標

灰色かび病・菌核病に 賢い選択・賢く防除



特長

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1.優れた予防効果 | 4.サニテーション効果(次世代菌密度低減効果) |
| 2.薬剤感受性低下菌に対して有効 | により、二次感染を抑える |
| 3.優れた浸達性を有し、残効性、耐雨性に優れる | 5.有用生物・天敵に対する安全性 |

◆ **ホクサン株式会社**



農林水産省登録 第23993号
有効成分：イソフェタミド36.0%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

殺菌剤分類 7

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量(ℓ)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソフェタミドを含む 農薬の総使用回数
きゅうり	菌核病、灰色かび病	1,000～1,500	100～300	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
	褐斑病、うどんこ病 つる枯病	1,500					
いちご	灰色かび病、うどんこ病						
すいか、メロン	つる枯病、うどんこ病						
トマト ミニトマト	葉かび病、うどんこ病 灰色かび病、菌核病 すすかび病						
なす	菌核病、うどんこ病 灰色かび病、すすかび病 黒枯病						
たまねぎ	灰色かび病	1,000～3,000		収穫3日前 まで	4回以内		4回以内
	小菌核病	1,000～1,500					
ねぎ	黒腐菌核病	1,000～2,000		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
キャベツ	菌核病	1,500		収穫前日 まで	3回以内		3回以内
はくさい	菌核病、黒斑病						
はなやさい類	黒すす病、菌核病						
レタス 非結球レタス	菌核病 灰色かび病						
豆類 (種実、ただし、 いんげんまめ、 らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病	1,500～3,000	収穫14日前 まで	2回以内	2回以内		
いんげんまめ	炭疽病	1,500					
さやえんどう	灰色かび病		1,500～3,000	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
かんきつ	灰色かび病	1,500	収穫7日前 まで				
	黒点病、そうか病						
ぶどう	黒とう病、灰色かび病 褐斑病、うどんこ病	1,500	収穫前日 まで				
もも、おうとう	灰星病	2,000		収穫前日 まで			
うめ	黒星病			収穫14日前 まで			
かき	うどんこ病 灰色かび病、落葉病						

効果・薬害等の注意事項

- 使用直前に、容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 出来るだけ発病前または発病初期に散布してください。
- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。
- ぶどうに使用する場合、果粒大豆粒大期から袋かけ前までの散布は、果粉の溶脱および果実に汚れを生じるおそれがあるので、十分に注意してください。
- なすに使用する場合、果実に汚れを生じるおそれがあるので、十分に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意事項

保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所に保管してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水は散布液調製に用いるなど、圃場等で使用してください。

本印刷物は2024年10月時点での知見に基づいて作成しています。



ホクサン株式会社

技術普及課 | 〒061-1111 北広島市北の里27番地4
TEL(011)370-2280 FAX(011)370-2113

ホームページの
製品情報へ

