

小麦の総合殺菌剤 **【北海道限定】**

無人航空機専用

フロンサイドSKY[®]

● 有効成分：フルアジナム……39.5%(w/w) ● 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

®は登録商標



雪腐大粒菌核病



紅色雪腐病



雪腐黒色小粒菌核病



なまぐさ黒穂病

特長

- ✔ 広い殺菌スペクトラムで**病害に優れた効果**を示します。
- ✔ **予防効果**に優れた薬剤です。
- ✔ **小麦の紅色雪腐病、雪腐大粒菌核病、雪腐小粒菌核病**に高い効果があります。
- ✔ **残効性、耐雨性**に優れます。
- ✔ **小麦のなまぐさ黒穂病**に優れた効果が確認されています。

本剤のご購入・ご使用に際してのお願い


▼ 安全にご使用いただくために ▼

本剤は皮膚感作性を有し、皮膚かぶれ等を生じることがあるので、以下の事項をご理解・ご注意ください。

カブレ注意

- かぶれやすい体質の人および本剤または他剤においてかぶれた経験のある人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触はさけてください。
- 薬剤調製時および無人航空機による散布の際は下記の装備を着用するとともに保護クリームを使用してください。
 操縦者：ヘルメット、保護メガネもしくは保護面、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣、ゴム長靴。
 補助者：ヘルメット、保護メガネ、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣、ゴム長靴。
- 散布など作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
- 散布薬液が周囲に飛散し周辺の動植物（通行人、家畜、他の作物等）に影響が無い様に散布区域の選定に留意するとともに周囲への注意喚起を行ってください。

防護装備の例



操縦者

補助者

効果・薬害等の注意事項

- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 本剤は保護殺菌効果（予防）主体であり、病原菌に感染した後の散布では効果が不十分な場合があるので散布時期に注意してください。

魚毒性等

- 使用残りの薬液を生じないように調製し使いきってください。
 散布器具及び容器の洗浄水は河川に流さないでください。

無人航空機による散布基準に従って作業を行ってください。

ご使用前には必ず
フロンサイド
SKY使用時の注意事項
動画をご覧ください。

▲動画はこちら

適用病害と使用方法


作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
小麦	雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病	8倍	0.8L/10a	根雪前	2回以内	無人航空機による散布	3回以内 (は種前は1回以内、は種後は2回以内)
	紅色雪腐病 なまぐさ黒穂病	16倍	1.6L/10a				

※本印刷物は2022年8月時点での知見に基づいて作成しています。

小麦 雪腐病対策試験例（小麦／雪腐黒色小粒菌核病）

◆ドローン散布

場 所：ホクサン（株）輪厚研究農場
 発生状況：少発生
 品 種：きたほなみ
 播 種：2017年 9月 22日
 薬剤散布：2017年 11月 29日
 根雪開始：2017年 12月 5日
 融雪開始：2018年 3月 31日
 調 査：2018年 4月 20日



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。

※空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。