

適用
拡大

農林水産省登録 第20871号

少量散布、無人航空機による散布が
可能となりました!!



ドローンでも散けます!

小麦・大麦用倒伏軽減剤

カルタイム[®]
フロアブル

®はクミアイ化学工業株式会社の登録商標

「止葉期～出穂始期」の散布で
大切な麦の倒伏を軽減します!!

カルタイムフロアブル

有効成分：プロヘキサジオンカルシウム塩・・・5.0%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

※本資料は2025年2月現在の知見に基づき作成しています。

●茎稈の伸長抑制による倒伏軽減効果

小麦の茎の伸長を阻害することにより短稈となり、倒伏軽減効果を示します。
主に第1節間、第2節間の伸長を抑制します。


●生育後半の使用で短稈効果

使用時期は止葉期～出穂始期までと出穂に近く、計画的な散布ができます。

●ムダが省けます

散布適期が比較的長く、小麦の生育具合を見てから倒伏しそうな場合に散布できるため、ムダが省けます。

◆ おすすめ使用時期



◆ 適用作物と使用方法

2025年2月現在

作物名	使用目的	使用時期	薬量 (/10a)	希釈水量 (/10a)	使用方法	本剤の 使用回数	プロヘキサジオン カルシウム塩を含む 農薬の総使用回数
小麦 (春播栽培)	茎稈の伸長抑制 による倒伏軽減	止葉期～出穂始期	150mL	100L	茎葉散布	1回	1回
				25～50L			
				0.8～1.6L	無人航空機 による散布		
小麦 (秋播栽培)		150～200mL	100L	茎葉散布			
			25～50L				
			0.8～1.6L	無人航空機 による散布			
大麦(裸麦を除く)	出穂10～5日前	150mL	100L	茎葉散布			

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●防除日誌を記載しましょう。



技術普及課 〒061-1111 北広島市北の里27番地4
TEL 011(370)2280 FAX.011(370)2113
<https://hokusan-kk.com>

