



水稻用一発処理除草剤

アッパレ[®]Ζ

1キロ粒剤 フロアブル ジャンボ 400FG **NEW**

手強い雑草に喝!



ナビエ



ホタルイ



オモダカ



雑草の
生育を強く抑制
×
効き目が速い



ミズアオイ



アゼナ



コウキヤガラ



ヘラオモダカ



エゾノサヤヌカグサ



アオミドロ



®は協友アグリ(株)の登録商標です。

特 長

ノビエはもちろん、SU抵抗性ホタルイ、クログワイにもしっかりと効果を發揮

- SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、アゼナ等)にも高い効果を發揮します。
- クログワイ、オモダカ等の多年生雑草を長期間強く抑制します。
- 効果の発現が速く、長期間持続します。
- FG剤は軽量かつ水面を自己拡散する新しい製剤です。

適用雑草の範囲及び使用方法

アッパレZ 1キロ粒剤

■有効成分(一般名) ピラクロニル:2.0% プロピリスルフロン:0.9% プロモブチド:9.0% ■人畜毒性:普通物 * ■農林水産省登録 第23719号

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期	
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ ミズガヤツリ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ エゾノサヤヌカガサ、オモダカ、コウキヤガラ シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg	本剤 1回 ピラクロニル剤 2回 プロピリスルフロン剤 2回 プロモブチド剤 2回	湛水散布 又は 無人 ヘリコプター による散布	田植同時 散布機で施用	ヘラオモダカ ミズアオイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカガサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	3葉期まで 1葉期まで 4葉期まで(但し、直播水稻は2葉期まで) 3葉期まで(但し、直播水稻は2葉期まで) 4葉期まで(但し、直播水稻は3葉期まで) 発生期まで 再生前～再生始期まで 2葉期まで 発生前～発生始期まで 草丈10cmまで 発生始期まで 草丈3cmまで 発生前
	移植直後～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで	移植直後～ノビエ3葉期 但し、移植後30日まで						
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ、ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	500ml	本剤 1回 ピラクロニル剤 2回 プロピリスルフロン剤 2回 プロモブチド剤 2回	原液湛水 散布 又は 水口施用	原液湛水 散布	ヘラオモダカ、ウリカワ ミズアオイ ホタルイ、ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカガサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	3葉期まで 1葉期まで 4葉期まで(但し、直播水稻は3葉期まで) 発生期まで 再生前～再生始期まで 2葉期まで 発生前～発生始期まで 草丈10cmまで 発生始期まで 草丈3cmまで 発生前
	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						

アッパレZ フロアブル

■有効成分(一般名) ピラクロニル:3.7% プロピリスルフロン:1.7% プロモブチド:16.8% ■人畜毒性:普通物 * ■農林水産省登録 第23778号

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期	
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ ミズガヤツリ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ エゾノサヤヌカガサ、オモダカ、コウキヤガラ シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	500ml	本剤 1回 ピラクロニル剤 2回 プロピリスルフロン剤 2回 プロモブチド剤 2回	原液湛水 散布 又は 水口施用	原液湛水 散布	ヘラオモダカ、ウリカワ ミズアオイ ホタルイ、ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカガサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ アオミドロ・藻類による表層はく離	3葉期まで 1葉期まで 4葉期まで(但し、直播水稻は3葉期まで) 発生期まで 再生前～再生始期まで 2葉期まで 発生前～発生始期まで 草丈10cmまで 発生始期まで 草丈3cmまで 発生前
	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ、ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						
	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						

アッパレZ ジャンボ

■有効成分(一般名) ピラクロニル:5.0% プロピリスルフロン:2.25% プロモブチド:22.5% ■人畜毒性:普通物 * ■農林水産省登録 第23720号

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期	
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 エゾノサヤヌカガサ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	本剤 1回 ピラクロニル剤 2回 プロピリスルフロン剤 2回 プロモブチド剤 2回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる	ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ ミズアオイ ホタルイ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカガサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ ナガエリルノゲイトウ アオミドロ・藻類による表層はく離	3葉期まで 1葉期まで 4葉期まで 発生期まで 再生前～再生始期まで 2葉期まで 発生前～発生始期まで 草丈10cmまで 発生始期まで 草丈3cmまで 再生始期 発生前～発生始
	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ、ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						
	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						

アッパレZ 400FG

■有効成分(一般名) ピラクロニル:5.0% プロピリスルフロン:2.25% プロモブチド:22.5% ■人畜毒性:普通物 * ■農林水産省登録 第24241号

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量	総使用回数	使用方法	雑草名	散布適期	
移植水稻	一年生雑草 多年生広葉雑草 エゾノサヤヌカガサ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	400g	本剤 1回 ピラクロニル剤 2回 プロピリスルフロン剤 2回 プロモブチド剤 2回	湛水散布、 湛水周縁散布 又は 無人航空機 による散布	湛水散布、 湛水周縁散布 又は 無人航空機 による散布	ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ ミズアオイ ホタルイ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカガサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ ナガエリルノゲイトウ アオミドロ・藻類による表層はく離	3葉期まで 1葉期まで 4葉期まで 発生期まで 再生前～再生始期まで 2葉期まで 発生前～発生始期まで 草丈10cmまで 発生始期まで 草丈3cmまで 再生始期 発生前～発生始
	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						
直播水稻	一年生雑草 マツバイ、ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						
	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで	稻1葉期～ ノビエ3葉期 但し、 収穫9日前まで						

* 毒物及び劇物に該当しないものを指す

⚠ 使用上の注意事項(一部抜粋)

【4製剤に共通する注意事項】

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることを望みます。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管管理に注意してください。
- 密封・密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、子供の手のとどかないところへ低温で乾燥した場所に保管してください。
- 散葉器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋・空容器等は水産動植物に影響を与えるないように適切に処理してください。
- 1キロ粒剤・フロアブル・FGに共通する注意事項

 - 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
 - 【フロアブル・ジャンボ・FGに共通する注意事項】
 - 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び播種付けはていねいに行ってください。移植時または移植直後に使用する場合や未熟な機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
 - 本剤は眼に対する刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 【フロアブルの注意事項】
 - 使用前には容器を軽く振ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

本資料の記載内容は2023年6月現在の登録内容に基づいています。



技術普及課/北広島市北の里27番地4 TEL:011(370)2280

TS2308.10T