

小麦の総合殺菌剤

殺菌剤

バロライカ[®]

BALALAIKA 水和剤

私の音色で穂もキレて!!





有効成分 キャプタン…50.0%
テブコナゾール…10.0%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

- ◆ 赤かび病フザリウム菌に効果の高いテブコナゾールと、ニバーレ菌に効果の高いキャプタンの混合剤です。
- ◆ DON(カビ毒の一種)生成とニバーレ菌の同時防除が可能です。
- ◆ 開花期に本剤を使用することで、安定した防除効果を示します。


登録内容 (2021年1月現在)

作物	適用病害	希釈倍率	使用液量 (10a当たり)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
小麦	赤かび病 赤さび病 黒変病 うどんこ病 葉枯症	500倍	60~150ℓ	収穫 14日前まで	2回以内	散布


●キャプタンを含む農薬の総使用回数：4回以内 ●テブコナゾールを含む農薬の総使用回数：3回以内(根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)

ニバーレ菌によるコムギ葉枯症試験例


一般社団法人 北海道植物防疫協会 (2019年)



ホクサン株式会社 (社内試験、2017年)



ホクサン株式会社 (社内試験、2015年)



注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤及びマシン油乳剤との混用はさけてください。
- 周辺農作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに、保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするのと同時に衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

※ 使用前にラベルをよく読んでください。 ※ ラベルの記載以外には使用しないでください。 ※ 小児の手の届く所には置かないでください。

F21.2.5T