

キク科雑草、イヌホオズキ  
に高い効果

# フルミオ WDG

フルミオは住友化学(株)の登録商標

フルミオキサジン水和剤

除草剤

えだまめに  
適用拡大



シロザ



イヌビユ



スペリヒユ



ノボロギク



イヌホオズキ



オオツメクサ



ハコベ



タデ



タニソバ



スカシタゴボウ

除草剤

# フルミオ<sup>®</sup> WDG

フルミオは住友化学(株)の登録商標


フルミオキサジン水和剤

## 上手な使い方

### 早期培土栽培

薬害をさけるため、培土後、速やかに散布してください。

散布適期：培土後



- 処理薬量は10g/10aで使用してください。
- 薬剤を処理してから萌芽日までの間が14日以内で、収量まで影響した事例がありますのでご注意ください。

## 使用上の注意事項

- 砂土での使用はさけてください。
- 処理時期が萌芽期に近いと薬害を生じるおそれがあるので、処理をおくれないようにしてください。
- 萌芽後に使用すると薬害を生じるので、必ず萌芽前に使用してください。  
※萌芽後の使用は適用外使用になりますので使用しないでください。
- 使用後著しい降雨があると、縮葉・褐変・初期の生育抑制を生じるおそれがあります。
- 本剤散布に用いた器具類はタンクホース内外に薬剤が残らないよう、使用後出来るだけ早く、専用の洗剤でよく洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないよう注意してください。

### 処理薬量10g/10a及び植付後7日散布で問題が認められなかった品種

メークイン、きたひめ、トヨシロ、アーリースターチ、キタアカリ、インカのめざめ、コナフブキ、ホッカイコガネ、男爵薯、スノーデン、さやか、ぼろしり、きたかむい、コナヒメ、アンドーバー、スノーマーチ、コナユタカ、オホーツクチップ

※上記以外の品種については知見がないため、十分に注意してください。