

やっかいな害虫を狙い撃ち！  
既存剤とは異なる系統の浸透性殺虫剤

# ウララ<sup>®</sup>DF

®は登録商標



無人航空機散布の登録あり！



## 1. アブラムシ類に高い効果

アブラムシ類、コナジラミ類などの半翅目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。特にアブラムシ類には、種に関わらず高い効果を示します。

## 2. 既存剤とは異なる系統の殺虫剤

既存剤のいずれとも異なる新規な作用機作を持っています。このため、既存の殺虫剤に抵抗性を示すアブラムシにも有効で、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。

## 3. ユニークな作用

アブラムシの吸汁を阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかりますが、吸汁活動は速効的に阻止します。

## 4. 高い浸透移行性と浸達性

高い浸透移行性と浸達性により、巻葉を作り薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。有効成分は上位展開葉や新梢にも移行します。

## 5. すぐれた残効性と耐雨性

ウララ<sup>®</sup>DFは葉中で適度な安定性を持ち、概ね2～3週間の残効性があります。また、耐雨性も良好です。有効成分が植物内に速やかに取り込まれるため、降雨による流亡が少ないためと考えられます。

## 6. 天敵・有用生物に対する安全性

カブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫に影響が少なく、IPMに適しています。

適用害虫と使用方法

太字が適用拡大になりました

\*印は本剤およびフロニカミドを含む農薬の総使用回数

| 作物名                                           | 適用害虫名                                      | 希釈倍数 (倍)      | 10 アール当り<br>使用液量 (ℓ) | 使用時期          | 総使用回数 *        | 使用方法                               |            |    |                |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------------------|------------|----|----------------|---------|
| りんご                                           | リンゴワタムシ                                    | 2,000         | 200 ～ 700            | 収穫 14 日前まで    | 2回以内           | 散布                                 |            |    |                |         |
| なし                                            | アブラムシ類                                     | 2,000 ～ 4,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| かき                                            | チャノキイロアザミウマ                                | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| もも                                            | アブラムシ類                                     | 2,000 ～ 4,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| ネクタリン                                         |                                            |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| 小粒核果類                                         | モモヒメヨコバイ                                   | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| ぶどう                                           | チャノキイロアザミウマ                                | 1,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | ツマグロアオカスミカメ                                | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| おうとう                                          | チャノキイロアザミウマ<br>コアオカスミカメ                    | 2,000         | 開花前まで                |               |                |                                    |            |    |                |         |
| 小麦                                            | アブラムシ類                                     | 4,000         | 100 ～ 300            | 収穫前日まで        | 3回以内           |                                    |            |    |                |         |
| いちご、メロン                                       |                                            | 2,000 ～ 4,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | コナジラミ類                                     | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| きゅうり                                          | アブラムシ類                                     | 2,000 ～ 4,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | コナジラミ類                                     | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| トマト、ミニトマト                                     | アブラムシ類                                     | 2,000 ～ 4,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | コナジラミ類<br>ミカンキイロアザミウマ                      | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| なす                                            | アブラムシ類                                     | 2,000 ～ 4,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | コナジラミ類<br>ミカンキイロアザミウマ<br>フタテンミドリヒメヨコバイ     | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| ししとう                                          | アブラムシ類                                     | 2,000 ～ 4,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| アスパラガス                                        | アブラムシ類、ネギアザミウマ                             | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| オクラ                                           | アブラムシ類<br>フタテンミドリヒメヨコバイ                    |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| レタス、非結球レタス<br>パセリ、だいこん                        | アブラムシ類                                     |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| ばれいしょ                                         |                                            |               |                      | 2,000 ～ 4,000 |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               |                                            |               |                      | 500           |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               |                                            | 1,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               |                                            | 32～64         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| やまのいも                                         | 50～100                                     |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | 2,000                                      |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | 32                                         |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | 50                                         |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| さといも、こんにゃく<br>やまのいも (むかご)                     | 2,000                                      | 25            | 収穫 7 日前まで            | 2回以内          | 無人航空機<br>による散布 |                                    |            |    |                |         |
| かぼちゃ、えだまめ<br>いんげんまめ、だいず<br>あずき、ごぼう<br>葉ごぼう    | 2,000 ～ 4,000                              | 1.6～3.2       |                      |               | 散布             |                                    |            |    |                |         |
|                                               |                                            | 3～5           |                      |               | 散布             |                                    |            |    |                |         |
|                                               |                                            | 100～300       |                      |               | 無人航空機<br>による散布 |                                    |            |    |                |         |
| さやえんどう<br>さやいんげん、えんどう                         |                                            | 1.6～3.2       |                      |               | 収穫 3 日前まで      | 無人航空機<br>による散布                     |            |    |                |         |
| ピーマン、すいか<br>うり類 (漬物用)<br>にがうり、ズッキーニ<br>ヤングコーン |                                            | 3～5           |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| 未成熟とうもろこし                                     |                                            | 32～64         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| 50～100                                        |                                            |               |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
| たまねぎ                                          |                                            | ネギアザミウマ       |                      |               | 2,000          | 収穫 7 日前まで                          | 3回以内       | 散布 |                |         |
| ねぎ                                            |                                            | 1,000 ～ 2,000 |                      |               | 収穫前日まで         |                                    |            |    |                |         |
| くわい                                           |                                            | 2,000         | 収穫 21 日前まで           |               |                |                                    |            |    |                |         |
| 非結球あぶらな科葉菜類<br>ほうれんそう、セリ<br>しゅんざく             | アブラムシ類                                     | 4,000         | 収穫前日まで               | 2回以内          | 散布             |                                    |            |    |                |         |
| エンダイブ、すいぜんじな<br>食用ぎく、ふき                       |                                            | 100 ～ 300     | 収穫 7 日前まで            |               |                |                                    |            |    |                |         |
| キャベツ、はくさい<br>ブロッコリー                           |                                            |               | 収穫前日まで               |               |                |                                    |            |    |                |         |
| カリフラワー                                        |                                            |               | 2,000                |               |                | 収穫 14 日前まで                         |            |    |                |         |
| みつば                                           |                                            |               | 2,000 ～ 4,000        |               |                | 収穫 3 日前まで<br>但し、伏せ込み栽培は<br>伏せ込み前まで |            |    |                |         |
| しそ、おかひじき                                      |                                            |               | 4,000                |               |                | 収穫 3 日前まで                          |            |    |                |         |
| 食用ミニバラ                                        |                                            |               | 2,000                |               |                |                                    |            |    |                |         |
| きく (葉)                                        |                                            |               | 4,000                |               |                |                                    |            |    |                |         |
| てんさい                                          |                                            |               | 2,000 ～ 4,000        |               |                | 200 ～ 400                          | 収穫 14 日前まで | 1回 | 無人航空機<br>による散布 |         |
|                                               |                                            |               | 32～64                |               |                |                                    |            |    |                | 1.6～3.2 |
|                                               |                                            |               | 50～100               |               |                |                                    |            |    |                | 3～5     |
| 茶                                             | チャトゲコナジラミ                                  | 1,000         | 200 ～ 400            | 摘採 7 日前まで     | 1回             | 散布                                 |            |    |                |         |
|                                               | チャノキイロアザミウマ<br>チャノミドリヒメヨコバイ<br>ツマグロアオカスミカメ | 1,000 ～ 2,000 |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |
|                                               | コミカンアブラムシ                                  | 2,000         |                      |               |                |                                    |            |    |                |         |



農林水産省登録 第21812号  
有効成分：フロニカミド・・・・・・10.0%  
人畜毒性：普通物 (毒劇物に該当しない  
ものを指している通称)

殺虫剤分類 29

使用上の注意事項

- 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、製品ラベルの注意事項を守ってください。
- きゅうりに使用する場合、徒長したものでは散布時展開葉の葉縁に葉害を生じることがありますが、その後の展開葉および生育には影響はありません。
- 非結球あぶらな科葉菜類に使用する場合、低温多湿等の薬液が乾燥しにくい条件下では葉害を生じるおそれがあるので注意してください。
- すももでは品種により、葉に葉害が生じる場合がありますので注意してください。
- ばれいしょに対して少量散布で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- つまみ菜、間引き菜には使用しないでください。
- ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、次のことに注意してください。
  - ・専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧してください。特に常温煙霧装置の選定および使用にあたっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
  - ・できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6時間以上密閉状態にしてください。できれば翌朝までそのままとし、開放後十分換気してから入室してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らないでください。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。

魚毒性等 …… この登録に係る使用方法では問題ありません。

保 管 …… 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼・乾燥した所に保管してください。

使用前にラベルをよく読んでください。  
ラベルの記載以外には使用しないでください。  
本剤は小児の手の届く所には置かないでください。  
空袋は園場などに放置せず、適切に処理してください。

●本印刷物は2024年11月時点での知見に基づいて作成しています。



ホクサン株式会社

技術普及課

〒061-1111 北広島市北の里27番地4  
TEL(011)370-2280 FAX(011)370-2113