

てんさい用除草剤

農林水産省登録 第22999号

®

ハーブブラック

®は ADAMA Quena N.V. の登録商標

WDG

成分：メタミトロン 70.0%

製品規格：2 kg × 8

安全性：人畜毒性～普通物*

※毒劇物に該当しないものを指している通称

除草剤分類

5

-  てんさい畑の主要広葉雑草（ヒユ類、タニソバ、タデ類など）に優れた効果
-  土壌処理および茎葉処理の両効果を発揮
-  てんさいに対する安全性が高く、人畜に対する影響も少ない
-  粉立ちが少なく取り扱いやすい顆粒タイプの水和剤
-  直播栽培にも使用できます

適用雑草の範囲および使用方法

(令和2年12月現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	10 アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	メタミトロンを含む農業の総使用回数
			薬量	希釈水量			
てんさい (移植栽培)	一年生広葉雑草	移植活着後 (雑草発生始期～発生揃期) 但し、収穫30日前まで	400～600g	50～100ℓ	5回以内	雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	5回以内
てんさい (直播栽培)		てんさい子葉展開期～ 本葉抽出期 (雑草発生始期～発生揃期)	250～350g				
		てんさい2葉期以降 (雑草発生始期～発生揃期) 但し、収穫30日前まで					

ハーブブラックとペタナールの同時散布でパワーアップ!

- 殺草スペクトラムが広がり、より安定した高い効果（ハコベ、シロザ、ナギナタコウジュなど）を示します。
- 効果の発現・完成がより早くなり、中耕作業にゆとりが出ます。
- 乾燥条件でも比較的安定した効果を示します。



ホクサン株式会社

北海道北広島市北の里27番地4

技術普及課

TEL: 011 (370) 2280

FAX: 011 (370) 2113