



強く、幅広く、
一発除草。



もう、ミズアオイ
オモダカには
困らない。

新規有効成分サイラが入った、水稲用一発処理除草剤。

ホクサン **シヤスタ**®

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ

新規有効成分
サイラ®

×

ピラゾレート

+

トリアファモン



農林水産省「稲発酵粗飼料
生産・給与技術マニュアル」
に掲載された農薬です。

ジャスタ、CYRA、サイラは三井化学アグロ(株)の登録商標
CYRA、サイラはシクロピリモレートのブランド名です。

- 特長

●サイラ×ピラゾレート

●強力な白化作用でイボクサ、エゾノサヤヌカグサ等の畦畔侵入雑草にも有効です。

●トリアファモン配合で、高葉齢のノビエに対する優れた枯殺力と長期残効性を有し、また、クログワイ、コウキヤガラ等幅広い草種に効果を

●1キロ粒剤、フロアブルは田植同時処理が可能です。また、1キロ粒剤は直播水稻において播種同時処理も

●適用雑草と使用方法

●シヤスタ 1キロ粒剤

■有効成分：サイラ(シクロピリモレート)…3.0%、ピラゾレート…6.0%、トリアファモン…0.50% ■農林水産省登録 第24289号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生 及び 多年生雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	1kg	1回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ ノビエ3.5葉期 ただし、 移植後30日まで			湛水散布 又は 無人航空機 による散布
直播水稻	一年生雑草 及びマツバイ ホタルイ、ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	は種時	1kg	1回	は種同時 散布機で施用
		は種直後～ ノビエ3.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			湛水散布 又は 無人航空機 による散布

●シヤスタ フロアブル

■有効成分：サイラ(シクロピリモレート)…5.5%、ピラゾレート…11.0%、トリアファモン…0.90% ■農林水産省登録 第24286号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生 及び 多年生雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	500ml	1回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ ノビエ3.5葉期 ただし、 移植後30日まで			原液湛水散布、 水口施用 又は 無人航空機 による滴下
直播水稻	一年生雑草 及びマツバイ、ホタルイ ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ3.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			

●シヤスタ ジャンボ

■有効成分：サイラ(シクロピリモレート)…7.5%、ピラゾレート…15.0%、トリアファモン…1.2% ■農林水産省登録 第24293号

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法
移植水稻	一年生 及び 多年生雑草	移植後1日～ ノビエ3葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (400g)	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる。
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3.5葉期 ただし、 収穫90日前まで			

各有効成分を含む農薬の総使用回数：シクロピリモレート剤…2回以内、ピラゾレート剤…2回以内、トリアファモン剤…2回以内

- 使用前にはラベルをよく読んでください。

●ラベルの記載以外には使用しないでください。

●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。

●防除日誌を記載しましょう。

*本製品は水稻用除草剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。

*本印刷物は2021年2月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。