

育苗箱専用 殺虫剤

ヨーバル[®]キング フロアブル

®ヨーバルはバイエルグループの登録商標です。

水稻の初期害虫に!

新規殺虫剤ヨーバルを含有
浸透性・移行性に優れ、長い残効性
扱いやすいフロアブル製剤



ヨーバル®キングフロアブル

殺虫剤分類

28

®ヨーバルはバイエルグループの登録商標です。

特 長

- **新規殺虫剤ヨーバル®(テトラニプロール) を含有。**
 - ・新しいジアミド系殺虫剤テトラニプロールを有効成分とする育苗箱灌注処理剤です。
 - ・水稲初期害虫のイネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、チョウ目害虫のフタオビコヤガに高い効果を示します。
- **浸透性・移行性に優れ、長い残効性。**
- **溶けやすく、扱いやすいフロアブル製剤です。**


適用害虫および使用方法

(2022年10月現在)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニプロールを含む農薬の総使用回数
稲 (育苗箱)	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ フタオビコヤガ	400倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当たり0.5ℓ	移植3日前 ～移植当日	1回	灌注	1回


●イネドロオイムシへの効果(処理50日後)

■ 寄生虫数平均(卵塊、幼虫、蛹) ■ 被害葉数平均



●フタオビコヤガへの効果(移植41日後)

■ 寄生虫数平均(幼虫、蛹) ■ 被害葉数平均



注意事項

●使用前によく振ってから使用して下さい。●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。●使用液調製後はできるだけ速やかに使いきってください。●軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。●本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきはいねいに行い、移植後田面が露出しないように注意してください。●空容器(空ビン)はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄液はタンクに入れてください。●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。●誤飲などないよう注意して下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の担当をうけてください。●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の担当をうけてください。●使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。●散布機具および容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えなうよう適切に処理してください。●直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

■ 使用前にはラベルをよく読んでください。 ■ ラベルの記載以外には使用しないでください。 ■ 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

F22.11.15T



ホクサン株式会社

技術普及課/北広島市北の里27番地4 TEL 011-370-2280

ホクサン製品情報はコチラ!
<https://hokusan-kk.com/product>



CHECK!