

水稲用初・中期一発処理除草剤

レオゼータ®

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ・300FG

狙われたら、もう終わり。

フェンキノトリオン
プロピリスルフロ
ンプロモブチド

3成分



エフィータ®配合
問題雑草に広く効く!!



本剤は(公財)日本植物調節剤研究協会での
A1S区分・難防除雑草一発処理(オモダカク
ロワイ・コウキヤガラ)で判定を取得しています。

◆ノビエ4葉期に卓効 ◆SU抵抗性雑草、多年生難防除雑草に優れた効果



ノビエ



オモダカ



ホタルイ



コナギ



クログワイ



コウキヤガラ



ミズアオイ

レオゼータ1キロ粒剤の適用と使用方法

農林水産省登録 第24697号

【有効成分】 フェンキノトリオン…3.0%
プロピシスルフロン…0.90% プロモブチド…9.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時 移植直後～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	1kg /10a	1回	田植同時 散布機で施用
直播水稻	一年生雑草 及び ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで			湛水散布

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈20cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	発生始め
クログワイ	草丈10cmまで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
セリ	再生期まで

レオゼータフロアブルの適用と使用方法

農林水産省登録 第24700号

【有効成分】 フェンキノトリオン…5.6%
プロピシスルフロン…1.7% プロモブチド…16.7%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	500ml /10a	1回	原液湛水散布
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで			

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈10cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	発生始めまで
クログワイ	草丈10cmまで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
セリ	再生期まで

レオゼータジャンボの適用と使用方法

農林水産省登録 第24698号

【有効成分】 フェンキノトリオン…10.0%
プロピシスルフロン…3.0% プロモブチド…30.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、オモダカ、クログワイ、 コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (300g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈20cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	発生始めまで
クログワイ	草丈10cmまで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
セリ	再生期まで

レオゼータ300FGの適用と使用方法

農林水産省登録 第24699号

【有効成分】 フェンキノトリオン…10.0%
プロピシスルフロン…3.0% プロモブチド…30.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、オモダカ、クログワイ、 コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	300g /10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散布 又は 無人航空機 による散布


主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈20cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	発生始めまで
クログワイ	草丈10cmまで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
セリ	再生期まで

有効成分の総使用回数
(4剤型共通)

フェンキノトリオンを含む農業の総使用回数	2回以内	プロピシスルフロンを含む農業の総使用回数	2回以内	プロモブチドを含む農業の総使用回数	2回以内
----------------------	------	----------------------	------	-------------------	------

(上記の内容はすべて2024年12月現在の登録内容)



使用上の注意事項 (一部、抜粋)

【4剤型共通の使用上の注意事項】

■本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに、時期を失ないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにしてください。

■以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。

①砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)

②軟弱な苗を移植した水田 ③極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田

■稲の根が露出する条件下では薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。

■著しい多雨条件下では除草効果が低下する場合があるので使用しないでください。

■田植前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用してください。

■本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分に注意してください。

■いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。

■本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器はほ場等に放置せず適切に処理してください。

SC24.11.10T