

「もっと大きな雑草も枯らしたい。」
だから、レブラスのギアを上げました。

AVH-301



多年生雑草に強い!
「アルテア」増量配合*

中後期除草剤レブラスから、
葉齢の進んだ雑草への効果を追求した「ギア」が誕生!
ホタルイは10cm^{*1}→20cm^{*2}まで、シズイは10cm^{*1}→30cm^{*2}まで、
オモダカは3葉期^{*3}→4葉期^{*3}までに枯らせるサイズがアップしました!

※1:レブラスにおける推奨使用時期 ※2:1キロ粒剤の移植水稻のみ ※3:レブラスの限界葉齢

新登場



水稻用 中後期除草剤

レブラス ギア[®]

1キロ粒剤/ジャンボ[®]/エアー粒剤

※アルテアはメタゾスルフロンの愛称です。
*日産化学(株)「アルテア」配合一発剤との比較。 ®は登録商標

水稲用 中後期除草剤

レブラス ギア®

1キロ粒剤/ジャンボ®/エアー粒剤

| 剤型 | 農林水産省 登録 | 有効成分 | | | 容量 |
|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | シクロピリモレート | テフリルトリオン | メタソスルフロン | |
| 1キロ粒剤 | 第24806号 | 1.5% | 2.5% | 1.2% | 1kg、10kg |
| ジャンボ | 第24929号 | 5.0% | 8.3% | 4.0% | 300g |
| | 第24930号 | 5.0% | 8.3% | 4.0% | 900g |

あのレブラスがさらにパワーアップ! 新しい水稲用中後期除草剤、登場!

■ 難防除雑草により強く! 枯らせる大きさがアップしました。

- ・ホタルイは花茎20cmまで!
- ・クログワイ・コウキヤガラ®は草丈50cmまで! #1キロ粒剤の移植水稲のみ
- ・オモダカは矢尻葉4葉期まで!

■ アルテアを最大量配合しています。(12g a.i./10a)

■ テフリルトリオンと、サイラ®(一般名:シクロピリモレート)を配合した、3種混合の水稲用中後期除草剤です。

AVH-301




多年生雑草に強い!
「アルテア」増量配合*

⑥サイラは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標 ※アルテアはメタソスルフロンの愛称です。 *日産化学㈱一発剤比

● 30cmまでのシズイも枯らす! (1キロ粒剤の移植水稲のみ)

● 矢尻葉4葉期までのオモダカも枯らす!



2024年 後志管内(後志農業改良普及センター試験)
散布日:レブラスギア1キロ粒剤 6/25
調査日:7/26(処理31日後)



2024年 福島県大玉村圃場(日産化学社内試験)
散布日:レブラスギア1キロ粒剤 6/18(オモダカ矢尻葉3~4葉)
調査日:7/23(処理35日後)

■ 適用雑草と使用方法

† 本剤及び、それぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 剤型・使用量 | 総使用回数† | 使用方法 |
|------|---|---|---|---|------------------------------|
| 移植水稲 | 一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 | 移植後14日 [†] ~ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで | 1キロ粒剤: 1kg/10a | 本剤……………1回 シクロピリモレート剤……2回以内 テフリルトリオン剤……2回以内 メタソスルフロン剤……2回以内 | 湛水散布 又は 無人航空機 による散布 |
| | 一年生雑草 マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ、セリ オモダカ、クログワイ | †北海道は 移植20日~ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで | ジャンボ: 小包装(パック) 10個 (300g)/10a | | |
| | | エアー粒剤: 300g/10a | 湛水散布、 湛水周縁散布 又は 無人航空機 による散布 | | |
| 直播水稲 | 一年生雑草 ホタルイ、ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ、セリ | 稲1葉期~ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで | 1キロ粒剤: 1kg/10a | | 湛水散布 又は 無人航空機 による散布 |

■ 各種雑草の散布適期

| 雑草名 | 1キロ粒剤 | ジャンボ | エアー粒剤 |
|--------|----------|-------|-------|
| ノビエ | 4葉期まで | | |
| コナギ | 心形葉2葉期まで | | |
| ホタルイ | 花茎20cmまで | | |
| ウリカワ | 6葉期まで | 5葉期まで | |
| ミズガヤツリ | 草丈20cmまで | | |
| ヘラオモダカ | 4葉期まで | 3葉期まで | |
| ヒルムシロ | 発生盛期まで | | |
| セリ | 再生期まで | | |
| オモダカ | 矢尻葉4葉期まで | | |
| クログワイ | 草丈50cmまで | | |
| コウキヤガラ | 草丈50cmまで | — | |
| シズイ | 草丈30cmまで | — | |
| イボクサ | 莖長5cmまで | — | |
| クサネム | 草丈5cmまで | — | |
| ミスアオイ | 舟形3葉期まで | — | |

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2025年1月末現在の登録内容に基づいています。



ホクサン株式会社

技術普及課/北広島市北の27番地4 TEL 011-370-2280